

	Migrena	Napięciowy ból głowy (NBG)	Klasterowy ból głowy
Wzorzec czasowy bólu	<i>Migrena epizodyczna:</i> - ataki od 4 do 72 godzin, z reguły 1-2 razy w miesiącu <i>Migrena przewlekła:</i> - ataki bólu głowy co najmniej 15 razy w miesiącu, w tym minimum 8 epizodów bólu o charakterze migreny	<i>Epizodyczne NBG:</i> - napady bólu głowy trwające od kilku godzin do kilku dni, od 1 do 14 epizodów w miesiącu <i>Przewlekły NBG:</i> - powyżej 15 ataków w miesiącu, często bez przerwy w bólu	Częste, krótkotrwałe (15-180 minut) napady nawracające raz do dwóch razy w roku na 6-12 tygodni; okresy bez bólu przez co najmniej 3 miesiące
Charakterystyka	Ból jednostronny, pulsujący	Z reguły obustronny, czołowy lub w okolicach skroni o uciskającym charakterze; może również zająć szyję	Zawsze jednostronny ból w okolicach oka lub skroni
Intensywność bólu głowy	Średnia do dużej	Niewielka do średniej	Ekstremalnie mocne
Objawy towarzyszące	Nudności i/lub wymioty, fotofobia, fonofobia, niekiedy aura	Brak typowych; możliwe niewielkie nudności lub światłowstręt; bez wymiotów	Jednostronne, autonomiczne objawy jak łzawienie i/lub zaczerwienienie oka, nieżyt nosa, opadanie powieki
Zachowanie pacjenta	Unika wysiłku fizycznego, preferuje ciche i ciemne miejsca	Brak	Pacjent niespokojny, zirytowany.

